



Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente i laboratori **FARMACA Srl** dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00  
Tel.: **+39 014372206** - E-mail: [info@farmacalab.it](mailto:info@farmacalab.it)

Oppure Rivolgersi presso la

## RICERCA DEL NICHEL

Il Nichel è l'agente allergizzante più studiato fra i metalli dal momento che provoca sensibilizzazione con una frequenza molto elevata.

E' presente non solo in oggetti metallici ma anche in molti alimenti nonché in alcuni prodotti cosmetici.

La dermatite allergica da contatto da nichel è la forma più comune di dermatite da contatto (DAC) nei paesi occidentali. Essa colpisce il 10% della popolazione e si manifesta con rossori, prurito, vescicole e desquamazione.

## COSA PROVOCA LA DERMATITE ALLERGICA E COME SI MANIFESTA?

Le dermatiti si manifestano solitamente con rossore, desquamazione, vescicole, bolle, abrasioni e croste. Talvolta lo stesso paziente presenta contemporaneamente più tipi di lesioni. Queste ultime,

presenti inizialmente solo nella zona di contatto, possono progressivamente estendersi.

Con l'esposizione a lungo termine ad un allergene, la pelle diventa spessa, rossa e squamosa. Nel corso del tempo, con recidive, la pelle può scurire.

Si possono manifestare due diversi gradi d'irritazione cutanea, "lieve" o "acuto":

- **“Lieve irritazione”** – La pelle si presenta inizialmente secca e screpolata. Con l'esposizione ripetuta, si presentano anche macchie, prurito, rossore, squame, e tendenza al gonfiore. La pelle può bruciare o pungero al contatto.

- **“Acuta irritazione”** - La pelle può bruciare, pungero e/o prudere. Si manifestano arrossamento, gonfiore, formazione di vesciche.

## COME SI CURA?

Per prima cosa, evitare la sostanza che provoca l'irritazione. E' quindi assolutamente consigliabile evitare tutte le sostanze che possono scatenare un'irritazione. Questo è però spesso difficile, se non impossibile.

I dermatologi consigliano di aiutarsi a preve-



Nichel metallo lucido

nire tali irritazioni da contatto utilizzando alcune accortezze come strategia per aggirare l'esposizione. (Ad esempio: l'uso di una crema barriera, utilizzo di guanti o di detersivi specifici, .....).

Anche nel momento in cui la dermatite da contatto regredisce, è necessario continuare ad evitare gli allergeni.

I soggetti che sviluppano una reazione allergica al nichel, hanno necessità di evitare tutte le fonti di nichel (gioielli, determinati alimenti nonché cosmetici e/o detersivi o tinture per capelli nelle quali possa essere presente).